


海域全般に、大型珪藻コシノディスカスが多く確認されます。窒素は、神戸地先で2～4 $\mu\text{g at/L}$ 台（陸水の影響が強く見られる駒ヶ林1-①を除く）、その他の海域で2 $\mu\text{g at/L}$ 台の値となっています。

(水温) 神戸地先：平均19.8℃。神戸沖：平均19.7℃。東浦地先：平均20.1℃。
(塩分) 神戸地先：32.48～32.71psu。神戸沖：32.39～32.68psu。東浦地先：32.71～32.77psu。
(珪藻)

海域全般に、コシノディスカス発生量は海水1Lあたり300～800細胞であり、小型珪藻類はほとんど確認されなかった。

		前回値	今回値	平年値	昨年値
神戸地先	水温		19.8	19.0	20.9
	窒素		4.0	7.6	6.6
	リン		0.48	0.58	0.67
神戸沖	水温		19.7	19.6	21.0
	窒素		2.3	4.6	5.0
	リン		0.41	0.54	0.63
東浦地先	水温		20.1	19.6	20.9
	窒素		2.4	4.4	5.1
	リン		0.42	0.53	0.61

(11/20)



栄養塩（窒素）図

2025年11月19日調査

上げ潮～満潮（明石海峡：西流）

調査時間； 8:08～10:29

