

兵庫県のり漁場環境情報 (淡路周辺海域 1号)


平成28年10月15日発行
兵庫のり研究所

窒素は、東浦および西浦では7~9 $\mu\text{g at / L}$ 、南浦では6 $\mu\text{g at / L}$ 台となっており、平年より高く十分量の値を示しています。この海域全般に珪藻の発生量は少ない状況です。

(珪藻) 播磨灘・大阪湾・紀伊水道に面した漁場とも、珪藻の発生量は少ない。大型珪藻コシノディスカスもほとんど認められなかった。

水温図

10/14北淡一宮
23.4~24.1°C
平均23.8°C



| | | 前回値 | 今回値 | 平年値 | 昨年値 |
|------|----|-----|------|------|------|
| 東浦地先 | 窒素 | | 7.8 | 4.2 | 5.9 |
| | リン | | 0.61 | 0.56 | 0.58 |
| 西浦地先 | 窒素 | | 8.5 | 3.5 | 4.2 |
| | リン | | 0.74 | 0.57 | 0.59 |
| 南浦地先 | 窒素 | | 6.6 | 3.5 | 3.5 |
| | リン | | 0.45 | 0.52 | 0.38 |

(10/13)

栄養塩 (窒素) 図

平成28年10月13日調査

